

子供の予防接種 - 予防接種を受けるお子さんの保護者（福岡市民）の方へ

| 予防接種の種類 | 対象年齢・期間 | | 接種回数 | | 接種間隔 |
|---|--|--|------|----|--|
| ヒブ 対象年齢は 生後2か月～4歳 ※右の対象者ごとに接種 方法が異なります。 | 【標準パターン】 ◎生後2～6か月に接種開始した場合 初回：生後12か月に至るまでに接種 ※生後12か月までに初回接種を完了していない場合は、初回接種の最後の注射終了後27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔をあけて追加接種を受けてください。 | | 初回 | 3回 | 27日（医師が必要と認めるときは20日）以上 【標準】 27～56日 |
| | | | 追加 | 1回 | 初回接種終了後7か月以上 【標準】 初回接種終了後7～13か月 |
| | 標準以外 | ○生後7～11か月に接種開始した場合 初回：生後12か月に至るまでに接種 ※生後12か月までに初回接種を完了していない場合の追加接種の間隔は標準パターンと同様です。 | 初回 | 2回 | 27日（医師が必要と認めるときは20日）以上 【標準】 27～56日 |
| | | ○1～4歳に接種開始した場合 | 追加 | 1回 | 初回接種終了後7か月以上 【標準】 初回接種終了後7～13か月 |
| 小児用肺炎球菌 対象年齢は 生後2か月～4歳 ※右の対象者ごとに接種 方法が異なります。 | 【標準パターン】 ◎生後2～6か月に接種開始した場合 初回：生後24か月（標準は生後12か月）に至るまでに接種 ※初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合は初回3回目の接種はできません。 追加：生後12か月以降（標準は生後12～15か月）に接種 | | 初回 | 3回 | 27日以上 |
| | | | 追加 | 1回 | 初回（3回分）接種終了後60日以上 |
| | 標準以外 | ○生後7～11か月に接種開始した場合 初回：生後24か月（標準は生後12か月）に至るまでに接種 追加：生後12か月以降に接種 | 初回 | 2回 | 27日以上 |
| | | ○1歳に接種開始した場合 | 追加 | 1回 | 初回接種終了後60日以上 |
| | ○2～4歳に接種開始した場合 | | 2回 | | 60日以上 |
| ○2～4歳に接種開始した場合 | | 1回 | | | |

| 予防接種の種類 | | 対象年齢・期間 | 接種回数 | 接種間隔 |
|---|------|---|------|--|
| 4種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ | 1期初回 | 生後3か月～7歳5か月 【標準】生後3～12か月 | 3回 | 20日以上 【標準】20～56日 |
| | 1期追加 | 生後3か月～7歳5か月 【標準】1期初回接種終了後12～18か月 | 1回 | 1期初回分(3回)接種終了後6か月以上 |
| 2種混合 ジフテリア 破傷風 | 2期 | 11歳～12歳 【標準】11歳 | 1回 | |
| BCG(結核) | | 1歳未満 【標準】生後5～7か月 | 1回 | |
| 麻しん(はしか) | 1期 | 生後12か月～1歳11か月 | 1回 | |
| 風しん | 2期 | 小学校入学前の1年間 ※接種期間:4月1日～翌年3月31日 | 1回 | |
| 日本脳炎 | 1期初回 | 生後6か月～7歳5か月 【標準】3歳 | 2回 | 6日以上 【標準】6～28日 |
| | 1期追加 | 生後6か月～7歳5か月 【標準】4歳 | 1回 | 1期初回接種終了後6か月以上 【標準】1期初回接種終了後おおむね1年 |
| | 2期 | 9～12歳 【標準】9歳 | 1回 | |
| | 特例措置 | 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人で、勸奨の差し控えにより接種機会を逃した人 | 1～4回 | |
| 水痘 (水ぼうそう) | | 生後12か月～2歳11か月 【標準】 1回目:生後12か月から生後15か月に達するまでに接種 2回目:1回目の接種終了後6か月から12か月までの間隔をおいて接種 | 2回 | 3か月以上 |
| | 経過措置 | 3～4歳(平成27年3月末まで) | 1回 | |
| 子宮頸がん ※2013年6月14日より、積極的に接種をお勧めしていません。接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けるようにしてください。 | | 小学6年生～高校1年生相当の年齢の女子 【標準】中学1年生相当の年齢の女子 | 3回 | 【標準】2回目は、1回目の接種から1か月または2か月後、3回目は、1回目から6か月後。 ※ワクチンの種類により2回目の接種間隔が違います。 |

※対象年齢・期間の人は無料