

子供の予防接種 一予防接種を受けるお子さんの保護者(福岡市民)の方へ一

Preventative Vaccinations for Children: A message for parents/guardians of children receiving vaccinations

予防接種の種類 Vaccination Category	対象年齢・期間 Eligibility		接種回数 Number of Vaccinations		接種間隔 Period between Doses
	◎生後 2~ ◎When firs 初回:生後	ーン】Standard Pattern 6 か月に接種開始した場合 st dose received at age 2-6 months 12 か月に至るまでに接種 nation: up to the age of 12 months	初回 Initial	3回 3 doses	27 日(医師が必要と認めるときは 20 日)以上 【標準】27~56 日 At least 27 days (20 days when deemed necessary by a doctor) Standard: 27-56 days
レブ Hib Vaccine 対象年齢は生後2か月~4歳 For children aged 2 months to 4 years ※右の対象者ごとに接種 方法が異なります。 *Method of vaccination differs depending on your situation, as explained in the adjacent columns.	※生後12か月までに初回接種を完了していない場合は、初回接種の最後の注射終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をあけて追加接種を受けてください。 *If the initial vaccination has not been completed by the age of 12 months, wait at least 27 days (20 days when deemed necessary by a doctor) from the last dose of the initial vaccination before receiving the additional dose.		追加 Additional	1回 1dose	初回接種終了後7か月 以上 At least 7 months after completing the initial vaccination 【標準】初回接種終了後7 ~13 月 Standard: 7-13 months after completing the initial vaccination
		O生後 7~11 か月に接種開始 した場合 OWhen first dose received at age 7-11 months 初回:生後 12 か月に至るまで に接種 Initial vaccination: up to the age	初回 Initial	2回 2doses	27 日(医師が必要と認めるときは 20 日)以上 【標準】27~56 日 At least 27 days (20 days when deemed necessary by a doctor) Standard: 27-56 days
	標準 以外 Non- standard が生後 12 かりを完了してい 接種の間隔は 同様です。 *If the initial va been complete months, the pe doses is the sar standard patter 〇1~4 歳に接	of 12 months ※生後 12 か月までに初回接種を完了していない場合の追加接種の間隔は標準パターンと同様です。 *If the initial vaccination has not been completed by the age of 12 months, the period between doses is the same as in the standard pattern.	追加 Additional	1 回 1 dose	初回接種終了後7か月 以上 At least 7 months after completing the initial vaccination 【標準】初回接種終了後 7~13 月 Standard: 7-13 months after completing the initial vaccination
		O1~4歳に接種開始した場合 OWhen first dose received at age 1-4 years	1 回 1 dos		

予防接種 Vaccination		対象年齢・期間 Eligibility		接種回数 Number of Vaccinations		接種間隔 Period between Doses
小児用肺炎球菌 Pediatric Pneumococcal Vaccine 対象年齢は生後2か月~4歳 For children aged 2 months to 4 years ※右の対象者ごとに接種 方法が異なります。 *Method of vaccination differs depending on your situation, as explained in the adjacent columns.		【標準パターン】Standard Pattern ②生後 2~6 か月に接種開始した場合 ③When first dose received at age 2-6 months 初回:生後24か月(標準は生後12か月)に至 るまでに接種 Initial vaccination: up to the age of 24 months (12 months standard)		初回 Initial	3回 3 doses	27 日以上 At least 27 days
		※初回 2 回目の接種が生後 12 か月を超えた場合は初回 3 回目の接種はできません。 追加:生後 12 か月以降(標準は生後 12~15 か月)に接種 *When the second dose of the initial vaccination occurs after reaching the age of 12 months, the third dose will not be administered. Additional dose: administered after reaching the age of 12 months (12-15 months standard)		追加 Additional	1回 1 dose	初回接種終了後 60 日以 上 At least 60 days after completing the initial vaccination
		1 m 1/4-	O生後7~11か月に接種開始した 場合 OWhen first dose received at age 7-11 months	初回 Initial	2回 2 doses	27 日以上 At least 27 days
			初回:生後24か月(標準は生後12か月)に至るまでに接種 Initial vaccination: up to the age of 24 months (12 months standard) 追加:生後12か月以降に接種 Additional dose: administered after reaching the age of 12 months	追加 Additional	1 回 1 dose	初回接種終了後 60 日以 上 At least 60 days after completing the initial vaccination
			O1歳に接種開始した場合 OWhen first dose received at age 1 year	2 回 2 doses		60 日以上 At least 60 days
			O2~4歳に接種開始した場合 OWhen first dose received at age 2-4 years	1 回 1 dose		
4種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	1期初回 Stage 1 Initial Vaccination	生後3か月~7歳5か月 Between age 3 months and 7 years 5 months 【標準】生後3~12か月 Standard: between age 3 and 12 months		3回 3 doses		20 日以上 At least 20 days 【標準】20~56 日 Standard: 20-56 days
Quadruple Vaccine (Diphtheria, pertussis, tetanus, polio)	1期追加 Stage 1 Additional Dose	生後3か月~7歳5か月 Between age 3 months and 7 years 5 months. 【標準】1期初回接種終了後12~18か月 Standard: 12-18 months after completing the Stage 1 Initial Vaccination		1 回 1 dose		1期初回(3回)接種終了後6か月以上 At least 6 months after completing the Stage 1 Initial Vaccination (3 doses)

予防接種の種類 Vaccination Category		対象年齢・期間 Eligibility	接種回数 Number of Vaccinations	接種間隔 Period between Doses
2種混合 ジファリア 破傷風 Double Vaccine (Diphtheria, tetanus)	2期 Stage 2	11 歳~12 歳【標準】11 歳 11-12 years, Standard: age 11 years	1 回 1 dose	
BCG(結核) BCG (Tuberculosis)		1歳末満【標準】生後 5~7 か月 Up to 1 year, Standard: age 5-7 months	1回 1 dose	
	1期 Stage 1	生後 12 か月~1歳 11 か月 Between age 12 months and 1 year 11 months	1 回 1 dose	
麻しん(はしか) 風しん Measles Rubella	2期 Stage 2	小学校入学前の1年間 ※接種期間:4月1日~翌年3月31日 During the one year period before entering elementary school *Vaccination period:1 April – 31 March of the following year	1回 1 dose	
日本脳炎 Japanese Encephalitis Vaccine	1期初回 Stage 1 Initial Vaccination	生後 6 か月~7 歳 5 か月 【標準】3 歳 Between age 6 months and 7 years 5 months, Standard: age 3 years	2回 2 doses	6日以上 At least 6 days 【標準】6~28 日 Standard: 6-28 days
	1期追加 Stage 1 Additional Vaccination	生後6か月~7歳5か月【標準】4歳 Between age 6 months and 7 years 5 months, Standard: age 4 years	1 🗉	1期初回接種終了後6か 月以上 At least 6 months after completing the Stage 1 Initial Vaccination 【標準】1期初回接種 終了後おおむね1年 Standard: roughly 1 year after completing the Stage 1 Initial Vaccination
	2期 Stage 2	9~12 歳【標準】9 歳 Age 9-12 years, Standard: age 9 years	1 回 1 dose	
	特例措置 Special Measure	平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人で、勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人 Persons born between 2 April 1995 and 1 April 2007 who missed out on receiving this vaccination due to a suspension of the recommendation of this vaccine.	1~4 回 1-4 doses	

予防接種の種類 Vaccination Category		対象年齢・期間 Eligibility	接種回数 Number of Vaccinations	接種間隔 Period between Doses
		生後 12 か月~2 歳 11 か月 Between age 12 months and 2 years 11 months		
水痘 (水ぽうそう) Varicella Vaccine (Chickenpox)		【標準】1回目:生後12か月から生後15か月 に達するまでに接種 2回目:1回目の接種終了後6か月から12か 月までの間隔をおいて接種 Standard: First dose - after age 12 months but before reaching age 15 months Second dose - 6-12 months after completing the first dose	2回 2 doses	3 月以上 At least 3 months
	経過措置 Interim Measure	3~4歳(平成 27 年 3 月末まで) Age 3-4 years (until end of March 2015)	1 回 1 dose	
子宮頸がん Human Papillo (HPV) Vaccine ※2013 年 6 月 極的には接種 おりません。接 は、有効性とり た上で受ける。 さい。 *Recommendat suspended since 2013. Make sur- understand the and the risks wh vaccinations.	ma Virus 14 日より、積 をお勧めして 種に当たって リスクを理解し ようにしてくだ tion e 14 June e that you effectiveness	小学6年生~高校1年生相当の年齢の女子 【標準】中学1年生相当の年齢の女子 Girls between age equivalent to elementary school 6th grader and high school 1st grader Standard: Girls of age equivalent to junior high school 1st grader	3回 3 doses	【標準】2 回目は、1 回目の接種から1か月または2 か月後、3 回目は、1 回目から6 か月後。 ※ワクチンの種類により2回目の接種間隔が違います。 Standard: Second dose administered 1 or 2 months after first dose; third dose administered 6 months after first dose. *The period between doses may differ depending on the type of vaccine.

※対象年齢・期間の人は無料 *Free for eligible persons.